

# АД'ЮВАНТ

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№0602-123-20-3/34276 від 03.08.2018.

# ПРЕДІКТ

## ПРЕДІКТ - ад'ювант для гербіцидів грунтової дії.

- Підвищує безпечність та ефективність гербіцидів ґрунтової дії та знижує знесення робочого розчину.

ПРЕДІКТ – це суміш рослинних олій, неіонних емульгаторів та прилипачів: метиловий ефір ріпакової олії 804.4 г/л, кокамід ДЕА 35.4 г/л, жирні кислоти талової олії 44.2 г/л. Має низьку в'язкість і легко змішується з широким спектром пестицидів, утворюючи стійку та однорідну емульсію.

ПРЕДІКТ забезпечує рівномірне покриття; підсилює зв'язування діючих речовин з колоїдними частинками ґрунту і зменшує небажане промивання за межі активної гербіцидної зони, знижуючи ризик пошкодження культури та подовжуючи краще контролювання бур'янів.

### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

**ОБЕРЕЖНО: Викликає серйозне подразнення очей. Шкідливий для мешканців водойм з тривалими наслідками.**  
Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг.

Не вживати харчові продукти, не пити та не курити під час роботи з препаратом.

Використовувати захисний одяг, рукавиці, окуляри та захист обличчя: респиратори РУ- 60М-А або РПГ-67А, окуляри типу ЗН, ПО-2 або ПО-3, рукавички технічного призначення.

ЯКЩО ПОПАЛО В ОЧІ: Ретельно промити протягом декількох хвилин під проточною водою. Якщо є контактні лінзи, зняти їх та продовжувати промивати.

В РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОРГАНІЗМ або поганого самопочуття негайно звернутися у медичній заклад або до лікаря.

НА ШКІРІ: Акуратно вимийте великою кількістю мила і води.

Під час застосування, транспортування та зберігання дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98

«Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві». Утилізуйте вміст контейнер згідно з діючим законодавством.

**Струсити перед використанням. ЗАХИЩАТИ ВІД МОРОЗУ.**



**УВАГА!**



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/34276 від 03.08.2018.

## ПРЕДІКТ - ад'ювант для гербіцидів ґрунтової дії.

Підвищує безпечність та ефективність гербіцидів ґрунтової дії та знижує знесення робочого розчину.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

**ДОЗУВАННЯ:** 0,2–0,4 л/га, в залежності від умов зволоження та вмісту гумусу.

**ЗМІШУВАННЯ:** Дотримуватись всіх інструкцій щодо змішування від виробника гербіциду.

**ДОДАВАТИ ПРЕДІКТ В БАКОВУ СУМІШ ОСТАННІМ** – після того, як гербіцид повністю розчинився в баківій суміші.

Не додавати **ПРЕДІКТ** до нерозчиненого гербіциду. Обприскування проводити при ввімкненій мішалці.

Культури/ Застосування	Гербіциди	Макс. концентрація
Всі істотні та неістотні культури	Будь-які зареєстровані	1.0% робочого розчину

**Струсити перед використанням.**

**ЗАХИЩАТИ ВІД МОРОЗУ.**

### КОНСУЛЬТАТИВНА ПОРАДА КОМПАНІЇ

Ця етикетка дає інформацію щодо використання продукту на розсуд споживача. Всі товари, що постачаються, є високоякісними, і ми вважаємо, що вони придатні для використання за призначенням. Проте, оскільки ми не можемо контролювати їх зберігання, а також поведіння, перемішування чи використання; погодні умови перед, під час та після застосування, які можуть впливати на дію продуктів, будь-які загальні умови та гарантії, регламентні чи інші, щодо якості чи відповідності наших продуктів визначеній цілі не надаються. Компанія та її офіційні продавці не несуть жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи невдалий результат дії продукту внаслідок умов зберігання, внесення або використання. Наш персонал не може впливати на ці умови, навіть якщо ми консультуємо і надаємо допомогу у використанні цих продуктів. СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВАЖЛИВІ.

### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЗАСТОСУВАТИ ТІЛЬКИ ЯК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ АД'ЮВАНТ.

Щодо максимальної кількості обробок та граничного терміну внесення ад'юванта, дотримуйтеся правил використання, встановлених виробником гербіцида, не перевищуючи максимальну концентрацію розчину 1.0 %.

**ПРЕДІКТ** можна вносити з усіма гербіцидами ґрунтової дії, що рекомендовані виробником гербіциду, але не пізніше, ніж фази росту культур, що вказані в таблиці нижче. Для культур, що не вказані в таблиці, строки останнього внесення запитуйте у виробника гербіциду.

Культура	Фаза росту, до якої можна вносити макс. норму
<b>Ріпак</b>	До (включно) утворення 10% стручків
<b>Льон звичайний або посівний</b>	До (включно) утворення 10% коробочок
<b>Цукрові буряки</b>	До (включно) 6-ти повністю розвинених листків
<b>Зернові</b>	До (включно) фази GS52 (поява 1/4 колосу)
<b>Кукурудза</b>	До (включно) появи видимої верхівки волоті
<b>Картопля</b>	До (включно) фази зав'язування бульб
<b>Квасоля, боби</b>	До (включно) утворення перших стручків
<b>Горох</b>	До (включно) утворення перших плоских стручків
<b>Горох цукровий</b>	До (включно) утворення перших стручків

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:** Під час роботи, де є доцільним, повинні використовуватися технічні засоби контролю в поєднанні з заходами індивідуального захисту. Використовувати захисний одяг, рукавиці, окуляри та захист обличчя: респіратори РУ-60М-А або РПГ-67А, окуляри типу ЗН, ПО-2 або ПО-3, рукавички технічного призначення. Берегти від контакту з очима, шкірою та особистим одягом. Забороняється їсти, пити або курити під час використання.

Ретельно мити руки після використання.

**ЗБЕРІГАННЯ Я УТИЛІЗАЦІЯ:** Зберігати в оригінальній упаковці, щільно закритій у безпечному місці. Під час застосування, транспортування та зберігання дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві».

**ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ:** Не використовувати з будь-яким пестицидом, який вноситься в зоні водойм.